

**Nombre paciente:**

**Datos antropométricos de alta.**

<b>Peso:</b>	<b>gr</b>	<b>Talla:</b>	<b>cm</b>	<b>Cc:</b>	<b>cm</b>
--------------	-----------	---------------	-----------	------------	-----------



**Indicación Alimentación:**

- 1) **Leche materna libre demanda**
- 2) **SOS Biberón:** Fórmula Aminoacídica Elecare
- 3) Para 60 ml de agua se utiliza 1 medida de fórmula.

**Volumen indicado:** ml cada 3 horas x 8 veces al día

**Horarios de alimentación:** 07- 10- 13- 16- 19- 22- 01- 04.

- **Preparación de biberones:**

**Leche Materna**

- Use biberón limpio y seco.
- Coloque volumen indicado de leche materna retermalizada.
- Administrar por sonda volumen indicado en epicrisis
- Finalice administrando 3cc de agua bidestilada o agua hervida fría por la sonda de manera de limpiarla y cerrar sonda.
- Lave el biberón para la próxima alimentación.

- **Preparación de biberones:**

**Fórmula Aminoacídica Elecare (medida incluida en el tarro)**

- Use biberón limpio y seco.
- Coloque volumen indicado de agua hervida tibia.
- Agregue 1 medida rasa del polvo de fórmula.
- Cierre el biberón y agítelo hasta que la mezcla quede homogénea.
- Administrar por sonda volumen indicado en epicrisis
- Finalice administrando 3cc de agua bidestilada o agua hervida fría por la sonda de manera de limpiarla y cerrar sonda.
- Lave el biberón para la próxima alimentación.



Los volúmenes y concentraciones de los ingredientes de las formulaciones indicadas se mantienen hasta el control correspondiente.

## INDICACIONES PARA CONTRAPRUEBA

- La contraprueba tiene una duración de 12 - 15 días.
- La madre se debe mantener con dieta de exclusión para APLV y soya.
- Durante 12 días se incorporará progresivamente Fórmula de Prematuros a los volúmenes de fórmula indicado, siguiendo el siguiente esquema:
  - Día 1 – 3 : 1 medida de Elecare +  $\frac{1}{2}$  medida de Fórmula Prematuros x 1 biberón
  - Día 4 – 6 :  $\frac{1}{2}$  medida de Elecare + 1 medida de Fórmula Prematuros x 2 biberón
  - Día 7 – 9 :  $\frac{1}{2}$  medida de Elecare + 1  $\frac{1}{2}$  medida de Fórmula Prematuros x 3 biberón
  - Día 10 – 12 : 0 medidas de Elecare + 2 medidas de Fórmula Prematuros x 4 biberón
- Si presenta reacción, debe detener la contraprueba y retomar indicación anterior: Leche materna y/o fórmula aminoacídica + madre en dieta de exclusión.

**NUTRICIONISTA NEONATOLOGÍA**

**18.06.2021**