

**FICHA TÉCNICA  
SMA GOLD TRANSICIÓN**

**Para bebés prematuros hasta los 12 meses de edad.**

Fecha de creación: 8 Marzo 2013

Fecha de actualización: N/A

**INFORMACIÓN LEGAL**

**Nombre:** SMA GOLD TRANSICIÓN  
**Descripción:** Fórmula con hierro para lactantes prematuros. Para condiciones tales como la salida del hospital después de un nacimiento prematuro.  
**Contenido Neto:** 400 g

**Listado de Ingredientes:** Suero en polvo reducido en minerales (suero electrodiálizado), mezcla de aceites vegetales [girasol oléico (*Helianthus annuus*), coco (*Cocos nucifera*), soya (*Glycine max*), palma (*Elaeis guineensis*), triglicéridos de cadena media (de *Cocos nucifera* o *Elaeis guineensis* aceites origen)], leche descremada en polvo, sólidos de jarabe de maíz, lactosa, suero concentrado en proteína enriquecido con alfa-lactoalbúmina, lecitina de soya, inositol, carbonato de calcio, fosfato de sodio monobásico, cloruro de calcio, hidróxido de calcio, citrato de sodio, bicarbonato de potasio, vitamina C, cloruro de sodio, ácidos grasos poliinsaturado de cadena larga de fuente celular simple [(Ácido Aráquidónico (AA)], cloruro de magnesio, ácido cítrico, ácidos grasos poliinsaturado de cadena larga de fuente celular simple [(Ácido docosahexaenoico (DHA)], bicarbonato de sodio, sulfato ferroso, taurina, cloruro de colina, sulfato de zinc, vitamina E (acetato de alfa-tocoferil), 5'-monofosfato de citidina, L-carnitina, niacinamida, concentrado de tocoferoles mixtos, 5'-monofosfato de uridina, palmitato de ascorbilo, 5'-monofosfato de adenosina; pantoteato de calcio; 5'-monofosfato de inosina disódica, 5'-monofosfato de guanosina disódica, sulfato de cobre, palmitato de vitamina A, clorhidrato de tiamina (Vitamina B1), clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6), colecalciferol (Vitamina D), riboflavina (Vitamina B2), beta caroteno, ácido fólico, sulfato de manganeso, yoduro de potasio, fitonadiona (vitamina K), selenito de sodio, biotina, cianocobalamina (Vitamina B12).

**Instrucciones de almacenaje:** Conservar la lata en un lugar fresco y seco. Antes de abrir la lata, verifique la integridad de su tapa metálica. Siempre coloque la tapa de material plástico después de cada uso. Utilizar dentro de las 4 semanas siguientes de haberla abierto. Evitar el almacenamiento prolongado a temperaturas demasiado altas. La fecha de caducidad y el número de lote aparecen en la base de la lata. El contenido es por peso seco y no por volumen. Algún asentamiento del polvo puede ocurrir. Si este producto cambia de olor, color y/o apariencia debe desecharse.

**Lote/Vencimiento:** Inkjet en la base del tarro proveniente de fábrica.  
L XXXXXX ELAB DD/MM/AA EXP DD/MM/AAAA

**Vida útil:** 18 meses a partir de la fecha de elaboración

Modo de uso: **PREPARACIÓN DE SMA GOLD TRANSICION**

Cuando se prepare la fórmula, es necesario observar la higiene, el manejo y el almacenamiento apropiados. SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES QUE SE DAN, SU BEBE PUEDE ENFERMARSE. La preparación, manejo y almacenamiento cuidadosos de la fórmula reducen este riesgo.

- 1.- Lave perfectamente las manos y todos los utensilios necesarios para la alimentación.
- 2.- Hierva todos los utensilios durante 5 minutos. Tape los biberones limpios hasta el momento de uso.
- 3.- Hierva agua potable durante 5 minutos. No exceda este lapso. Cuando el agua se haya enfriado, vierta la cantidad correcta en el biberón.
- 4.- Use la medida que viene en el envase para calcular la cantidad correcta de polvo. Nivele cada medida usando el lomo de un cuchillo limpio y seco. Vierta el polvo en el agua.
- 5.- Tape y agite el biberón, coloque el chupón y verifique la temperatura antes de alimentar al bebé con unas gotas sobre la parte interior de la muñeca. La leche debe estar tibia.

**PREPARACIÓN PARA UNA SOLA ALIMENTACIÓN**

Los patrones de alimentación de los bebés prematuros varían de acuerdo a la edad, el tamaño y el estado clínico de cada niño. Esta tabla es una guía y su bebé puede consumir más o menos de lo que indican las cantidades. Siga las proporciones recomendadas a continuación a menos que su médico le sugiera lo contrario. No prepare tomas más concentradas o más diluidas adicionando más polvo o agua.

Promedio de peso (kg)	Agua tibia (previamente hervida) (mL)	Medidores al ras	Alimentaciones aproximadas en 24 horas*
2	60	2	6 - 8
3,5	90	3	6 - 8
5	120	4	6
6,5	180	6	5
7	180	6	5

\*el volumen diario y el número de alimentaciones puede variar más o menos en 24 horas.

Una medida = 4,7 gramos

- Mezclar 1 medida de SMA GOLD TRANSICION en 30 mL de agua.
- Preparar el SMA GOLD TRANSICIÓN un poco antes de alimentar a su bebé.
- Si es necesaria la preparación anticipada, refrigérela y úsela en un lapso no mayor de 24 horas.
- Una vez que comienza la alimentación, utilizar los restos de las porciones en un lapso de 2 horas, en caso contrario deben ser descartadas.

Rendimiento del producto: Porciones por envase: aprox. 85 porciones de 30 mL

Información regulatoria:

Consulte con el profesional de la salud de su bebé para determinar cuando está listo para cambiar de fórmula y para que le aconseje acerca de los alimentos complementarios.

Exclusivo bajo prescripción médica.

#### INFORMACIÓN IMPORTANTE

**La leche materna es el mejor alimento para el bebé.** SMA GOLD TRANSICIÓN es una fórmula diseñada para bebés con condiciones tales como la salida del hospital después de nacimiento prematuro. Se recomienda la alimentación complementaria de acuerdo a las instrucciones del médico. Sólo debe utilizarse bajo supervisión médica.

Información Nutricional:

INFORMACION NUTRICIONAL				
NUTRIENTES	UNIDADES	100 kcal	30 ml	Por cada 100 g
Valor Energético	Kcal	100	22	524
	kJ	424	94	2220
Proteínas	g	2,6	0,57	14
60% del suero de leche	g	1,6	0,34	8,1
40% de caseína	g	1	0,23	5,4
Grasas	g	5,4	1,2	28
Ácido araquidónico	mg	18	4	96
Ácido docosahexaenoico	mg	11	2,4	57
Ácido linoléico	mg	774	170	4036
Carbohidratos	g	10,3	2,3	54
Humedad	g	122	27	1,6
Cenizas	g	0,58	0,13	3
Grasas saturadas	g	1,9	0,42	10
Grasas monoinsaturadas	g	1,8	0,39	9,3
Grasas poliinsaturadas	g	0,89	0,2	4,6
Grasas trans	g	0,03	0,01	0,17
Fibra alimentaria	g	0	0	0
Sodio	mg	37	8,1	193
Nucleótidos	mg	3,9	0,85	20
L-Carnitina	mg	1,5	0,33	7,8
<b>VITAMINAS</b>				
Vitamina A	UI	458	100	2390
Betacaroteno	mcg	22	4,8	114
Vitamina D	UI	82	18	429
Vitamina E	UI	3,1	0,67	16
Vitamina K	mcg	8,6	1,9	45
Vitamina B1	mcg	150	33	780
Vitamina B2	mcg	224	49	1170
Vitamina B6	mcg	110	24	571
Vitamina B12	mcg	0,3	0,07	1,6

Niacina	mcg	1370	300	7143
Ácido fólico	mcg	20	4,4	104
Ácido pantoténico	mcg	548	120	2857
Biotina	mcg	2,9	0,63	15
Vitamina C	mg	15	3,3	78
Colina	mg	18	3,9	94
Inositol	mg	35	7,7	182
Taurina	mg	6,9	1,5	36
<b>MINERALES</b>				
Calcio	mg	100	22	521
Fósforo	mg	58	13	300
Magnesio	mg	9,0	2	47
Hierro	mg	1,7	0,37	8,9
Zinc	mg	1	0,22	5,2
Manganeso	mcg	6,8	1,5	36
Cobre	mcg	85	19	443
Iodo	mcg	14	3	71
Potasio	mg	97	21	504
Cloruro	mg	79	17	414
Selenio	mcg	2,1	0,45	11
<i>Cada 19,2 g de polvo preparado de SMA GOLD TRANSICIÓN aportan 100Kcal.</i>				

### INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca comercial: Wyeth ®

Claims y textos comerciales: - Con AA y DHA  
- Para bebés prematuros hasta los 12 meses de edad.

Logos: - Sistema de Biofactores Wyeth  
- SMA GOLD TRANSICIÓN  
- Alimentando a su bebé prematuro en casa

País de origen: Irlanda  
Información de (R) Marca Registrada, autorizada a:  
Fabricación y Wyeth Nutritionals Ireland. Fabricado por Wyeth Nutritionals Ireland. Askeaton, Co.  
Comercialización Limerick, Irlanda. Hecho en Irlanda.  
en Chile: Importado en Chile por Aspen Chile S.A., Avenida Andrés Bello #2325, piso 10, Providencia, Santiago. Para mayor información consulte [www.nutricioncontigo.cl](http://www.nutricioncontigo.cl); Servicio al Consumidor 800 260 799 y desde celulares (02) 2944 7479.

---