

Instalación y retiro de catéteres en RN prematuro < 32 s y/o < 1.500 con O2terapia

OBJETIVO: Estandarizar el acceso vascular en prematuros de muy bajo peso

RESPONSABLE : Pediatra - neonatólogo. Matrona

EJECUTOR: Pediatra neonatólogo residente ó Coordinador

CRITERIO DE INSTALACIÓN

	< 28 SEMANAS	≥ 28 SEMANAS
Catéter Venoso Umbilical 2 lúmenes	Todos	Si FiO2 > 0,30 o evolución tórpida
Catéter Arterial Umbilical	Todos	Presión arterial < percentil 10
Catéter Percutáneo central 2 lúmenes	Si a los 4 días de vida requiere : Alpar, Vasoactivos , Acceso venoso para infundir antibióticos y vía periférica difícil	
	A las 24 hrs. de vida si no se logró instalar catéter venoso umbilical	

CRITERIO DE RETIRO

	< 28 SEMANAS	≥ 28 SEMANAS
Catéter Venoso Umbilical 2 lúmenes	7 días de vida	< 7 días de vida cuando cumple los 3 siguientes criterios: 1. Tolera 60 cc/kg de leche 2. Sin vasoactivos 3. SDR resuelto
Catéter Arterial Umbilical	7 días	Si se suspenden vasoactivos
Catéter Percutáneo central 2 lúmenes	Si cumple los 3 siguientes criterios : 1. Tolera > 80 cc/kg de leche 2. Sin vasoactivos 3. Acceso venoso periférico fácil	
	Si catéter cumple 30 días	

